

โรคพิษสุนัขบ้า

อันตราย! แต่ป้องกันได้

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อในระบบประสาท จากสัตว์สู่คน เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าไม่ไ้พบแค่สุนัขเท่านั้น แต่พบได้ในสัตว์เลื้อยคลานด้วยหลายชนิด เช่น ลูบิซ แมว วัว ลิง หนู กระต่าย เป็นต้น

ผู้ที่เป็โรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มี ยารักษา แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน

อาการหลังจากติดเชื้อพิษสุนัขบ้า

ระยะที่ ๑

มีไข้ เบื่ออาหาร

ระยะที่ ๒

มีอาการที่ทางประสาท คลุ้มคลั่ง

ระยะที่ ๓

ภาวะพาลโง่โง่เหลว หัวใจหยุดเต้น โคม่า และเสียชีวิต

๓ ขั้นตอนการป้องกันการติดเชื้

พาสีต๋เสี่ยงไปฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

หลีกเลี่ยงไม่ให้ ถูกสัตว์กัด ทำร้าย

หลังโดนกัด รีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อฉีดวัคซีนป้องกัน

กองสาธารณสุขท้องถิ่น

โรคพิษสุนัขบ้า

กลุ่มเสี่ยง

อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ถูกกัด ข่วน แล้วไม่ไปฉีดวัคซีน

การติดต่อ

ถูกสัตว์มีเชื้อ เลียบาดแผล

อาการผู้ป่วย

เบื่ออาหารเจ็บคอ มีไข้ อ่อนเพลีย

กลัวลม กลืนลำบากกลัวน้ำ

คันรุนแรง บริเวณที่เคี้ยวถูกกัด อัมพาตตาย

ตัวอย่างว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

ระยะแรก

- ◆ ผนังเยื่อในร่างร้าง
- ◆ ควบคุมอ้วก คื่นเร้ว
- ◆ ควบคุมอ้วก เบื่ออาหาร

ระยะตื่นเกิน

- ◆ ควบคุมการควบคุม
- ◆ ควบคุมอ้วก
- ◆ ควบคุม

ระยะมีพยาธิ

- ◆ ผนังเยื่อ
- ◆ ควบคุมอ้วก
- ◆ ควบคุม

เกิดจากเชื้อ เรบีส์ไวรัส (RABIES VIRUS) มีสัตว์เสี่ยงถูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว วัว ควาย ลิง หนู กระต่าย กระรอก ฯลฯ เป็นพาหะนำโรค

ผู้ติดเชื้อมีอาการ ตาย ๑๐๐%

คำแนะนำเมื่อถูกกัด - ข่วน-เลีย

ล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาด หลาย ๆ ครั้ง

ใส่ยา เติมน้ำ

กักหมา - แมว เพื่อสังเกตอาการ ๑๐ วัน

*****คำแนะนำสำหรับผู้เสี่ยง*****

ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี

ออกนอกบ้านต้องใส่สายจูง

ทำหมัน สุนัขเก่าเปิด

อย่าเหยียบ

กาลา ๕ ย

กันสุนัขกัด

อย่าเหยียบ

หาง หัว ตัว ขา

ให้สุนัขตาใจ

อย่าแยก

สุนัขที่กัดกันด้วยมือ

เป่า

อย่าหยิบ

อาหารที่สุนัขกำลังกิน

กับสุนัขที่ไม่รู้จัก หรือไม่มีเจ้าของ

อย่ายุ่ง

กลุ่มงานป้องกันโรค กองสาธารณสุขท้องถิ่น